



COIN MAX



Manual de Aplicação

Todas as recomendações para você
alcançar a mais alta performance do
produto.

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



AIPIM

- ✓ **200ml para 20 litros de água, com três folhas formadas**
- ✓ **300 ml para 20 litros de água, após 45 dias da primeira aplicação**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



ALHO

- ✓ **200ml para 20 litros de água, 15 dias após a brota**
- ✓ **300 ml para 20 litros de água, após 30 dias após a primeira aplicação**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



ALHO-PORÓ

- ✓ **200ml para 20 litros de água, 15 dias após a brota**
- ✓ **300 ml para 20 litros de água, após 30 dias após a primeira aplicação**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br



COIN MAX



ARROZ

- ✓ **200ml para 20 litros de água no início do perfilamento**
- ✓ **300ml para 20 litros de água no alongamento**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



ABÓBORA

- ✓ **300ml para 20 litros de água, 14 dias após a germinação**
- ✓ **200 ml para 20 litros de água, 28 dias após a primeira aplicação**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



AÇAFRÃO

- ✓ **200ml para 20 litros de água, 14 dias após a brota**
- ✓ **200 ml para 20 litros de água, 30 dias após a primeira aplicação**
- ✓ **100ml para 20 litros de água, 30 dias após a segunda aplicação**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br



COIN MAX



AMEIXA

- ✓ **200ml para 20 litros de água, no enchimento da gema**
- ✓ **200 ml para 20 litros de água, após a florada**
- ✓ **200ml para 20 litros de água após o desbaste**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



BANANA

✔ 250ml para 20 litros de água, a cada 90 dias

IMPORTANTE

- ✔ Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos
- ✔ Não aplicar em tempo chuvoso
- ✔ Não aplicar em calda

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



BATATA DOCE

- ✓ **200ml para 20 litros de água, com três folhas formadas**
- ✓ **300 ml para 20 litros de água, após 45 dias da primeira aplicação**

IMPORTANTE


- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



BATATA INGLESA

- ✓ **200ml para 20 litros de água, com três folhas formadas**
- ✓ **300 ml para 20 litros de água, após 45 dias da primeira aplicação**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



BATATA SALSA

- ✓ **200ml para 20 litros de água, com três folhas formadas**
- ✓ **300 ml para 20 litros de água, após 45 dias da primeira aplicação**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



BERINJELA

- ✔ **300ml para 20 litros de água, 14 dias após a germinação**
- ✔ **200 ml para 20 litros de água, 30 dias após a primeira aplicação**

IMPORTANTE

- ✔ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✔ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✔ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



CABOTIÁ

- ✓ **300ml para 20 litros de água, 14 dias após a germinação**
- ✓ **200 ml para 20 litros de água, 28 dias após a primeira aplicação**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br



COIN MAX



CANA DE AÇÚCAR

- ✓ **200ml para 20 litros de água, no início do perfilhamento**
- ✓ **300 ml para 20 litros de água, no início do crescimento vegetativo**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br



COIN MAX



CEBOLA

- ✓ **200ml para 20 litros de água, 15 dias após a brota**
- ✓ **300 ml para 20 litros de água, após 30 dias após a primeira aplicação**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



FEIJÃO

- ✓ **500ml para cada 20 litros de água**
- ✓ **1 aplicação entre V4 e V6**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br



COIN MAX



FUMO

- ✓ **100ml para 20 litros de água no canteiro, 5 dias após a germinação**
- ✓ **200ml para 20 litros de água, de 7 a 14 dias após o plantio, no solo**
- ✓ **200ml para 20 litros de água, 20 dias após a primeira aplicação no solo**
- ✓ **100ml para 20 litros de água, 20 dias após a segunda aplicação no solo**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



GENGIBRE

- ✓ **200ml para 20 litros de água, 14 dias após a brota**
- ✓ **200 ml para 20 litros de água, 30 dias após a primeira aplicação**
- ✓ **100ml para 20 litros de água, 30 dias após a segunda aplicação**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br



COIN MAX



GINSENG

- ✓ **200ml para 20 litros de água, 14 dias após a brota**
- ✓ **200 ml para 20 litros de água, 30 dias após a primeira aplicação**
- ✓ **100ml para 20 litros de água, 30 dias após a segunda aplicação**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



HORTALIÇAS

- ✓ 100ml para 20 litros de água, 7 dias após a germinação (viveiro)
- ✓ 300 ml para 20 litros de água, 7 dias após o transplante (solo)
- ✓ 200ml para 20 litros de água, 14 dias após o transplante (solo)

IMPORTANTE

- ✓ Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos
- ✓ Não aplicar em tempo chuvoso
- ✓ Não aplicar em calda

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



JARDIM

✓ 100ml para 20 litros de água, a cada 15 dias

IMPORTANTE

- ✓ Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos
- ✓ Não aplicar em tempo chuvoso
- ✓ Não aplicar em calda

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



JILÓ

- ✓ **300ml para 20 litros de água, 14 dias após a germinação**
- ✓ **200 ml para 20 litros de água, 30 dias após a primeira aplicação**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



MAÇÃ

- ✓ **200ml para 20 litros de água, no enchimento da gema**
- ✓ **200 ml para 20 litros de água, após a florada**
- ✓ **200ml para 20 litros de água após o desbaste**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



MANGA

- ✓ 200ml para 20 litros de água, antes da florada
- ✓ 200ml para 20 litros de água, após a florada
- ✓ 200ml para 20 litros de água, 42 dias após a primeira aplicação após a florada.

IMPORTANTE


- ✓ Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos
- ✓ Não aplicar em tempo chuvoso
- ✓ Não aplicar em calda

Mais Informações: agroeda.com.br













COIN MAX



MARACUJÁ

-  **100ml para 20 litros de água, no viveiro, 7 dias após a germinação**
-  **100 ml para 20 litros de água, no viveiro, 15 dias após a germinação**
-  **100ml para 20 litros de água, 7 dias após o plantio (campo)**
-  **200ml para 20 litros de água, no barbante**
-  **200ml para 20 litros de água, no arame**

IMPORTANTE

-  **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
-  **Não aplicar em tempo chuvoso**
-  **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



MELÃO

- ✓ **300ml para 20 litros de água, 14 dias após a germinação**
- ✓ **200 ml para 20 litros de água, 28 dias após a primeira aplicação**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br



COIN MAX



MELANCIA

- ✓ **300ml para 20 litros de água, 14 dias após a germinação**
- ✓ **200 ml para 20 litros de água, 28 dias após a primeira aplicação**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



MORANGA

- ✓ **300ml para 20 litros de água, 14 dias após a germinação**
- ✓ **200 ml para 20 litros de água, 28 dias após a primeira aplicação**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br



COIN MAX



MILHO POR HECTARE

✓ 5,0 litros para 200 litros de água entre V4 e V6

AJUDA A COMBATER A CIGARRINHA

✓ 2,0 litros para 200 litros de água no V1

✓ 3,0 litros para 200 litros de água no V4

IMPORTANTE

✓ Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos

✓ Não aplicar em tempo chuvoso

✓ Não aplicar em calda

Mais Informações: agroeda.com.br



COIN MAX



MORANGO

✓ 100ml para 20 litros de água, a cada 15 dias

IMPORTANTE

- ✓ Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos
- ✓ Não aplicar em tempo chuvoso
- ✓ Não aplicar em calda

Mais Informações: agroeda.com.br



COIN MAX



NECTARINA

- ✓ **200ml para 20 litros de água, no enchimento da gema**
- ✓ **200 ml para 20 litros de água, após a florada**
- ✓ **200ml para 20 litros de água após o desbaste**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br



COIN MAX



PERA

- ✔ **200ml para 20 litros de água, no enchimento da gema**
- ✔ **200 ml para 20 litros de água, após a florada**
- ✔ **200ml para 20 litros de água após o desbaste**

IMPORTANTE

- ✔ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✔ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✔ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



PÊSSEGO

- ✓ **200ml para 20 litros de água, no enchimento da gema**
- ✓ **200 ml para 20 litros de água, após a florada**
- ✓ **200ml para 20 litros de água após o desbaste**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



PIMENTA

- ✓ 100ml para 20 litros de água, 7 dias após a germinação (viveiro)
- ✓ 300 ml para 20 litros de água, 14 dias após o transplante (solo)
- ✓ 200ml para 20 litros de água, 30 dias após o transplante (solo)

IMPORTANTE

- ✓ Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos
- ✓ Não aplicar em tempo chuvoso
- ✓ Não aplicar em calda

Mais Informações: agroeda.com.br



COIN MAX



PIMENTÃO

- ✓ 100ml para 20 litros de água, 7 dias após a germinação (viveiro)
- ✓ 300 ml para 20 litros de água, 14 dias após o transplante (solo)
- ✓ 200ml para 20 litros de água, 30 dias após o transplante (solo)

IMPORTANTE

- ✓ Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos
- ✓ Não aplicar em tempo chuvoso
- ✓ Não aplicar em calda

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



PASTAGEM

- ✓ **300ml para 20 litros de água, na rebrota**
- ✓ **200 ml para 20 litros de água, após 21 dias**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



PASTAGEM DEGRADADA

- ✓ **300ml para 20 litros de água, na pastagem degradada**
- ✓ **200 ml para 20 litros de água, após 21 dias**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br



COIN MAX



QUIABO

- ✔ **300ml para 20 litros de água, 14 dias após a germinação**
- ✔ **200 ml para 20 litros de água, 30 dias após a primeira aplicação**

IMPORTANTE

- ✔ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✔ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✔ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



SOJA POR HECTARE

5,0 litros para 200 litros de água entre V4 e V6

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



TOMATE

- ✔ 100ml para cada 20 litros de água, 2 dias após a germinação (viveiro)
- ✔ 100ml para cada 20 litros de água, 7 dias após a primeira aplicação (viveiro)
- ✔ 300ml para cada 20 litros de água, 7 dias após o transplante (solo)
- ✔ 200ml para cada 20 litros de água, 28 dias após a primeira aplicação no solo

IMPORTANTE

- ✔ Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos
- ✔ Não aplicar em tempo chuvoso
- ✔ Não aplicar em calda

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



TRIGO

- ✓ **200ml para 20 litros de água no início do perfilamento**
- ✓ **300ml para 20 litros de água no alongamento**

IMPORTANTE

- ✓ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✓ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✓ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br





COIN MAX



UVA



- ✔ **200ml para 20 litros de água, na brotação**
- ✔ **200 ml para 20 litros de água, após a florada (a-limpa)**
- ✔ **200ml para 20 litros de água, no enchimento de grão (bago de ervilha)**

IMPORTANTE

- ✔ **Carência mínima de 2 a 3 dias de intervalo para a aplicação do inseticida e demais defensivos**
- ✔ **Não aplicar em tempo chuvoso**
- ✔ **Não aplicar em calda**

Mais Informações: agroeda.com.br

